


Quelles sont les professions concernées ?

- Métiers agricoles
- Entretien des espaces verts
- Loisirs aquatiques
- Métiers du bâtiment
- Eboueurs
- Agents d'entretien en extérieur
- Vétérinaires
- Dératiseurs



Bon à savoir

La leptospirose est reconnue comme maladie professionnelle au niveau mondial, européen et national

En France, les tableaux n°19A du régime général de la Sécurité Sociale et n°5 du régime agricole listent les activités pour lesquelles la leptospirose est reconnue comme maladie professionnelle.

L'essentiel

- Consultez un médecin immédiatement si présence d'un ou plusieurs signes
- Un traitement antibiotique existe : il doit être pris dès que possible
- Il est possible d'attraper la leptospirose plusieurs fois au cours de votre vie, il faut donc rester vigilant et adopter les bons gestes

EN SAVOIR PLUS

Pour toute question, contactez votre médecin du travail ou le pôle technique de votre Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises

8 Rue des Arts et Métiers
Zone Franche Dillon—BP 282
97203 FORT-DE-FRANCE CEDEX

05.96.50.51.71
contact@sist-972.fr

Document élaboré par SIST 972

Edition de Août 2022

LA LEPTOSPIROSE




Prévenir les risques au travail

Qu'est-ce-que la leptospirose ?

La **leptospirose** est une maladie infectieuse due à la bactérie **leptospire** présente chez certains animaux (rongeurs et animaux domestiques, sauvages et d'élevages).

Comment se transmet la leptospirose ?



Contamination directe :

- Morsure par un animal porteur
- Contact avec les urines d'un animal porteur

Contamination indirecte :

- Contact avec des eaux/boues contaminées:
 1. Les animaux porteurs peuvent contaminer les eaux douces (vives ou stagnantes) et zones boueuses à proximité de leur lieu de vie.
 2. L'Homme peut alors se contaminer à son tour au contact de l'eau souillée.

Comment pénètre-t-elle dans l'organisme ?

Les muqueuses : yeux, bouche, nez

La peau en cas de lésion : égratignures, plaies



Quels sont les moyens de protection ?



Lutter contre la présence de rongeurs et nettoyer les locaux infectés



Se laver les mains régulièrement avec de l'eau potable et du savon (avant de manger, boire ou fumer)



En cas de plaie : **laver et désinfecter soigneusement la plaie** et **la protéger** avec un pansement imperméable



Porter des **Equipements de Protection Individuelle** (EPI), selon l'activité : bottes, combinaison, lunettes de protection et gants

Et la vaccination ?

Elle n'est efficace que contre une seule souche de leptospirose et ne protège pas contre les autres formes



Son indication doit être posée par le médecin après évaluation du risque

Elle ne peut suffire comme prévention contre la maladie et ne dispense en aucun cas du port des EPI

Quels sont les signes de la maladie ?

Ils apparaissent 1 à 2 semaines après la contamination

Symptômes grippaux :

1. Forte fièvre ($> 39^{\circ}$)
2. Douleurs musculaires et articulaires
3. Douleurs abdominales et troubles digestifs
4. Maux de tête

La maladie peut s'aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes

avec une atteinte du foie (avec coloration des yeux), des reins (urine très foncée), des méninges, des poumons et du cœur



Que faire si l'un de ces signes apparaît ?



Consulter immédiatement un médecin en lui signalant l'activité à risque pratiquée

Un **traitement antibiotique existe**, il est d'autant plus efficace lorsqu'il est pris tôt



La leptospirose est en général bénigne mais peut-être grave et mortelle dans 5% à 20% des cas